

# METADENE

ESCA MICROGRANULARE A BASE DI METALDEIDE

## Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura 5 g

Eccipienti e attrattivi\* q.b. a 100 g

\*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante

atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

**ATTENZIONE:  
MANIPOLARE CON  
PRUDENZA**

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,  
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

## Registrazione del Ministero della Sanità n° 5467 del 14-09-1983

**Stabilimenti di produzione e confezionamento:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD); L.B.I. Sri - San Vittore Olona (MI); KOLLANT Srl - Vigonovo (VE); DIACHEM Albano S.Alessandro (BG) - LUQSA Afores, s/n 25173 Sudanel, Lleida (Spagna) - FRIQUISA Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna) - Industrialchimica Srl Via Sorgaglia, 40 35020 ARRE (PD) - RATICIDAS S.L.U. Avda. Can Pallas, N 20 4a 10 - 08192 Sant Quirze del Valles, BARCELONA (Spagna).

**Stabilimenti di confezionamento:** AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id, Polonia.

**Distribuito da:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111  
EURO T.S.A. S.r.l. - Via Marconi 13, 24040 Fornovo S.Giovanni (BG) - Tel. 0363 337114  
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l. - Via Tito Speri 3/5, 20028 S. Vittore Olona (MI)  
Tel. 0331 518550  
BAVICCHI S.p.A. - Via della Valtiera, 293 - 06135 - Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. 075 393941  
GREEN RAVENNA S.r.l. - Via Matteotti 16, 48121 Ravenna - Tel. 0541 485421  
ITALPOLLINA S.p.A. - Loc. Casalmenini, 10 - 37010 Rivoli Veronese (VR) - Tel. 045 6205500  
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l., Via Paracelso 2, 20041 Agrate Brianza (MB)  
CISA ADRIATICA S.a.s. - Viale della Libertà, 4 - 65010 Moscufo (PE) - Tel. 085 975028  
VEGA S.r.l. - Via Statale 255 N. 367 - 44047 Sant'Agostino (FE) - Tel. 0532 1716513

**Taglie:** g 250-500-750; kg1-2-3-5-10-15-20-25

**Partita n.**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

## CARATTERISTICHE E DOSI

Il "METADENE" è un efficace mezzo di lotta contro le lumache grandi e piccole, limacce e chioccioline.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, floreali, ornamentali

Dose d'impiego: 100 - 300 g per 100 m<sup>2</sup>

Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia, distribuendo il "METADENE" a piccoli mucchietti o a file.

Per le colture elencate di seguito, il prodotto si usa ai dosaggi sopra indicati esclusivamente lungo tutti i bordi del campo, per trattare una fascia di m 0,5 - 1, quindi non trattando direttamente le colture.

- Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambu', Cuori di Palma, etc.)

**COMPATIBILITA':** "METADENE" va distribuito da solo.

**NOCIVITA':** nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

**INTERVALLO DI SICUREZZA 20 GIORNI**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. il contenitore non può essere riutilizzato.

# METADENE - PFnPE

ESCA MICROGRANULARE A BASE DI METALDEIDE

## Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura 5 g

Eccipienti e attrattivi\* q.b. a 100 g

\*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante

atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

**ATTENZIONE:  
MANIPOLARE CON  
PRUDENZA**

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,  
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

**Registrazione del Ministero della Sanità n° 5467 del 14-09-1983**

**Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02 novembre 2021.**

**Stabilimenti di produzione e confezionamento:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD); L.B.I. Sri - San Vittore Olona (MI); KOLLANT Srl - Vigonovo (VE); DIACHEM Albano S.Alessandro (BG) - LUQSA Afores, s/n 25173 Sudanel, Lleida (Spagna) - FRIQUISA Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna) - Industrialchimica Srl Via Sorgaglia, 40 35020 ARRE (PD) - RATICIDAS S.L.U. Avda. Can Pallas, N 20 4a 10 - 08192 Sant Quirze del Valles, BARCELONA (Spagna).

**Distribuito da:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111  
EURO T.S.A. S.r.l. - Via Marconi 13, 24040 Fornovo S.Giovanni (BG) - Tel. 0363 337114  
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO s.r.l. - Via Tito Speri 3/5, 20028 S. Vittore Olona (MI)  
Tel. 0331 518550  
BAVICCHI S.p.A. - Via della Valtiera, 293 - 06135 - Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. 075 393941  
GREEN RAVENNA S.r.l. - Via Matteotti 16, 48121 Ravenna - Tel. 0541 485421  
ITALPOLLINA S.p.A. - Loc. Casalmenini, 10 - 37010 Rivoli Veronese (VR) - Tel. 045 6205500  
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l., Via Paracelso 2, 20041 Agrate Brianza (MB)  
CISA ADRIATICA S.a.s. - Viale della Libertà, 4 - 65010 Moscufo (PE) - Tel. 085 975028  
VEGA S.r.l. - Via Statale 255 N. 367 - 44047 Sant'Agostino (FE) - Tel. 0532 1716513

**Taglie:** g 250-500-750; kg1-2-3-5

**Partita n.**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

## CARATTERISTICHE E DOSI

Il "METADENE" è un efficace mezzo di lotta contro le lumache grandi e piccole, limacce e chioccioline.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, floreali, ornamentali

Dose d'impiego: 100 - 300 g per 100 m<sup>2</sup>

Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia, distribuendo il "METADENE" a piccoli mucchietti o a file.

Per le colture elencate di seguito, il prodotto si usa ai dosaggi sopra indicati esclusivamente lungo tutti i bordi del campo, per trattare una fascia di m 0,5 - 1, quindi non trattando direttamente le colture.

- Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambù, Cuori di Palma, etc.)

**COMPATIBILITA':** "METADENE" va distribuito da solo.

**NOCIVITA':** nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

## INTERVALLO DI SICUREZZA 20 GIORNI

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.