

Prima parte
Etichetta per utilizzatori professionali

Seconda parte
Etichetta per utilizzatori non professionali

CARAKOL AGRO

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

Carakol Agro

Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79

Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura

5,00 g

Coformulanti*

q. b. a 100 g

*contiene denatonio benzoato,

sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

KOLLANT S.r.l.

Via C. Colombo, 7/7A – 30030 Vigonovo (VE)

Tel. 049 9983000

Stabilimenti di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) / KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g

1 – 3 – 4 – 5 – 25 Kg

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare l'ingestione l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non contaminare

l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Carakol Agro contiene una sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

Carakol Agro distrugge limacce, lumache, chioccioline e gasteropodi in genere infestanti le colture di seguito riportate.

Carakol Agro attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; ha una buona resistenza all'ammuffimento, all'umidità e al vento in condizioni d'uso non particolarmente gravose; è di facile e pratico impiego.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca granulare **Carakol Agro** va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura, con terreno coltivato a:

- Fragola (in campo);
- Aglio (in campo); pomodoro, melanzana, peperone (in campo e serra);
- Melone, anguria (in campo);
- Broccoli, cavolfiore (in campo);
- Legumi, piselli, fagiolini, fagioli (in campo);
- Seme di colza, girasole, soia, cotone, barbabietola da zucchero, cereali (orzo, avena, segale, triticale e frumento);
- Mais, miglio, sorgo;
- Colture ornamentali e floreali, vivai, piantine e piantagioni.

Applicare **70 g per ogni 100 m² di superficie**. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2 applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno

alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI, FAGIOLI; 20 GIORNI PRIMA PER AGLIO; 3 GIORNI PRIMA PER BROCCOLI, CAVOLFIORE; 90 GIORNI PRIMA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 60 GIORNI PRIMA PER CEREALI (ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE E FRUMENTO)

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

CARAKOL AGRO

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
Limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - resiste nel tempo

Carakol Agro

Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79

Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g

Coformulanti* q. b. a 100 g

**contiene denatonio benzoato,*

sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

KOLLANT S.r.l.

Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)

Tel. 049 9983000

Stabilimenti di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) / KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100 g

Partita n. vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

CARAKOL AGRO PFnPE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

Carakol Agro

Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con
validità fino al 02/05/2020

Composizione:

100 g di prodotto contengono	
Metaldeide acetica pura	5,00 g
Coformulanti*	q. b. a 100 g

** contiene denatonio benzoato,
sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di
bambini e di animali non bersaglio*

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale. P270 – Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'uso.

KOLLANT S.r.l.

**Via C. Colombo, 7/7A – 30030 Vigonovo (VE)
Tel. 049 9983000**

Stabilimenti di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) / KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g / 1 – 3 – 4 – 5 Kg

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare questo
prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali
domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare
e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare
l'ingestione l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli
indumenti - Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione del
prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione

lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non contaminare
l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Per proteggere gli
uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito
accidentalmente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in
benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50
mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea,
vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma,
paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia:
sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Carakol Agro contiene una sostanza amaricante atta a ridurre
il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di
animali non bersaglio.

Carakol Agro distrugge limacce, lumache, chioccioline e
gasteropodi in genere infestanti le colture di seguito riportate.

Carakol Agro attira con le proteine contenute nell'esca i
molluschi; ha una buona resistenza all'ammuffimento,
all'umidità e al vento in condizioni d'uso non particolarmente
gravose; è di facile e pratico impiego.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca granulare **Carakol Agro** va sparsa a spaglio, a file o a
mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o
annaffiatura, con terreno coltivato a:

- Fragola (in campo);
- Aglio, pomodoro, melanzana, peperone (in campo);
- Melone, anguria (in campo);
- Broccoli, cavolfiore (in campo);
- Legumi, piselli, fagiolini, fagioli (in campo);
- Cereali (orzo, avena, segale, triticale e frumento);
- Mais, miglio, sorgo;
- Colture ornamentali e floreali.

Applicare **70 g per ogni 100 m² di superficie**. Se necessario
ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2
applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno
alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo
i margini delle aree da proteggere.

**LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA
MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE
DI ALTRI ANIMALI.**

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA
DELLA RACCOLTA PER LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI,
FAGIOLI; 20 GIORNI PRIMA PER AGLIO; 3 GIORNI
PRIMA PER BROCCOLI, CAVOLFIORE; 60 GIORNI
PRIMA PER CEREALI (ORZO, AVENA, SEGALE,
TRITICALE E FRUMENTO)**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente
etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli
animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CARAKOL AGRO PFnPE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
Limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - resiste nel tempo

Carakol Agro

Registrazione del Ministero della Sanità N° 3.219 del 28.06.79
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con
validità fino al 02/05/2020

Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g

Coformulanti* q. b. a 100 g

**contiene denatonio benzoato,*

*sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di
bambini e di animali non bersaglio*

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale. P270 – Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'uso.

KOLLANT S.r.l.

Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)

Tel. 049 9983000

Stabilimenti di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) / KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100 g

Partita n. vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**