



COMPO Italia S.r.l. | Via Marconato 8 | 20811 Cesano Maderno MB

**OGGETTO: adeguamento classificazione CLP per i prodotti
COMPO Duaxo PPO PFnPO (reg. n.13684/PPO del 22/06/2012),
COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO (reg. n. 13683/PPO del 22/06/2012),
COMPO Fazilo Pronto Uso PFnPO (reg. n. 13215/PPO del 29/12/2011),
Ortiva Hobby PFnPE (reg. n.12315 del del 20.04.2005)**

Gentile Cliente,

25.11.2019

con la presente La informiamo che a seguito di Verifica della classificazione ed etichettatura di pericolo di prodotti fitosanitari secondo i requisiti del regolamento (CE)N. 1272/2008 e successivi adeguamenti, le etichette dei prodotti in oggetto sono state modificate come segue:

- **COMPO Duaxo PPO PFnPO (reg.n.13684/PPO del 22/06/2012):** inserimento della frase *“Non disperdere nell'ambiente (P273)”*.
- **COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO (reg. n. 13683/PPO del 22/06/2012):** inserimento della frase *“Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280)”*.
- **COMPO Fazilo pronto Uso PFnPO (reg. n. 13215/PPO del 29/12/2011):** inserimento delle frasi *“Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). Non disperdere nell'ambiente (P273)”*.
- **Ortiva Hobby PFnPE (reg. n.12315 del 20.04.2005):** sostituzione della frase *“Contiene alcool etossilato e sale sodico di polimeri a base di ac. naftalensulfonici condensati con formaldeide”* con *“Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica (EUH208)”* ed inserimento della frase *“Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280)”*.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte a vecchia etichetta giacenti presso i punti vendita e i nostri magazzini devono avvenire volantinando con le etichette aggiornate allegate.

La invitiamo ad informare i Suoi acquirenti e a condividere questa comunicazione con le persone eventualmente interessate.

Siamo a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento ritenga necessario.

Cordiali saluti,

COMPO Italia Srl

Marketing
Annunziata Guerra
Marketing Manager
annunziata.guerra@
compo.com
0362.512401

COMPO Italia S.r.l.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno MB
Telefono +39 362 512.1
Telefax +39 362 512.855
www.compo-hobby.it

Società a socio unico,
Dir. e Coord. COMPO GmbH
Sede legale Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno MB

Cap. Soc Euro 300.000 i.v.
Registro Imprese MB 07250340960
R.E.A. MB 1875036
Cod. Mecc. MB048531
Cod. Fisc. e Part. IVA IT07250340960

Coordinate Bancarie: Commerzbank AG
Corso Europa, 2
20122 Milano
IBAN IT25W0309501600959102893500
SWIFT COBAITMMXXX

COMPO DUAXO PPO PF_nPO

Concentrato Emulsionabile (EC)
Fungicida

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono

Difenoconazolo puro g **1,80** (= 16,7 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Leggere l'etichetta prima dell'uso (P103). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alla regolamentazione nazionale (P501). Non disperdere nell'ambiente (P273).

COMPO ITALIA Srl - Via Marconato 8 I - 20811 Cesano Maderno (MB). Tel. 0362512.1

Officine di produzione: FormiChem GmbH – Anna-von-Philipp-Str. 33 b – 86633 Neuburg a. d. Donau (Germania)
Schirm GmbH – Baar Ebenhause (Germany)

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione n. 13684/PPO Ministero della Salute del 22/06/2012

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

Contenuto Netto: ml 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 250, 300, 500

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia : sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

COMPO Duaxo PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali. Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle preesistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 21 giorni.

MODALITÀ D'USO

COMPO Duaxo PPO si utilizza diluito in acqua e nebulizzato fino ad una bagnatura visibile delle piante infestate. E' preferibile intervenire nelle ore serali.

Piante ornamentali in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Erysiphe* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), Macchie fogliari (*Alternaria* spp.) alla dose di 10 ml/litro di acqua intervenendo alla prima comparsa dei sintomi e ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.

Rose in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Sphaerotheca* spp.), Black spot (*Diplocarpon rosae*), Ruggine della rosa (*Phragmidium rosae*), alla dose di 10 ml/litro di acqua intervenendo alla prima comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.

Per le rose e le piante ornamentali in balcone e giardino considerando una dose di 10 ml/ 1 litro di acqua la quantità di soluzione da utilizzare è legata all'altezza delle piante:

per altezze fino a 50 cm distribuire 450 ml di soluzione su una superficie di 10 m²

per altezze da 50 cm a 125 cm distribuire 600 ml di soluzione su una superficie di 10 m²

per altezze oltre a 125 cm distribuire 750 ml di soluzione su una superficie di 10 m²

Piante ornamentali legnose da balcone e giardino

- contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma, a partire dalla comparsa delle macchie sulla pagina superiore delle foglie ripetendo i trattamenti ogni 10-20 giorni con interventi più ravvicinati se le foglie restano umide per più di 9 ore.
- contro Oidio (*Erysiphe* spp.), alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma a partire dalla comparsa dei primi sintomi sulle foglie ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.
- contro Monilia (*Monilia* spp.) alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma a partire da inizio a fine fioritura.

FITOTOSSICITÀ

COMPO Duaxo PPO è in genere ben tollerato dalle piante, ma si consiglia di effettuare un trattamento preliminare a spot su alcuni fiori e foglie utilizzando un periodo di osservazione di 10 giorni, sulle varietà di ornamentali di nuova introduzione.

CONSIGLI D'IMPIEGO

- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione
- Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

AGITARE PRIMA DELL'USO

NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COMPO DUAXO PRONTO USO PF_nPO

Liquido Pronto all'uso (RTU)
Fungicida

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono

Difenoconazolo puro g **0,016** (= 0,167 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401). Contiene 1-2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica (EUH 208).

CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto **P(101)**. Tenere fuori dalla portata dei bambini (**P102**). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (**P270**). Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alla regolamentazione nazionale (**P501**). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (**P280**).

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare dell'autorizzazione:

COMPO ITALIA Srl - Via Marconato 8 I-20811 Cesano Maderno (MB). Tel. 0362512.1

Officine di produzione: Bib Production & Packaging b.v. – Randweg 7, 6045 JK Roermond – The Netherlands
Schirm GmbH – Baar Ebenhause (Germany)

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione n. 13683/PPO Ministero della Salute del 22/06/2012

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

Contenuto Netto:

a) Trigger: 100 - 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000 ml

b) Twin-chamber spray system: 100 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 1000 ml

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

COMPO Duaxo Pronto Uso è un fungicida sistemico pronto all'uso appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino per un uso localizzato. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali e delle rose. Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle preesistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 14 giorni.

MODALITÀ D'USO

Agitare bene COMPO Duaxo Pronto Uso prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulle piante da trattare fino ad una bagnatura visibile di entrambe le facce delle foglie. E' preferibile intervenire nelle ore serali.

Piante ornamentali in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Erysiphe* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), Macchie fogliari (*Alternaria* spp.) intervenire alla prima comparsa dei sintomi e ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.

Rose in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Sphaeroteca* spp.), Black spot (*Diplocarpon rosae*), Ruggine della rosa (*Phragmidium rosae*), intervenire alla prima comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.

FITOTOSSICITÀ

COMPO Duaxo Pronto Uso è in genere ben tollerato dalle piante, ma si consiglia di effettuare un trattamento preliminare a spot su alcuni fiori e foglie utilizzando un periodo di osservazione di 10 giorni, sulle varietà di ornamentali di nuova introduzione.

CONSIGLI D'IMPIEGO

- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

AGITARE PRIMA DELL'USO

PROTEGGERE DALLE BASSE TEMPERATURE

NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

“Etichetta autorizzata con D.D. del 30-10-2012 , modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 e ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R.

n. 55/2012, con validità dal 12/10/2019”

COMPO FAZILO PRONTO USO PF_nPO

INSETTICIDA-ACARICIDA POLIVALENTE PER PIANTE ORNAMENTALI
LIQUIDO PRONTO ALL'USO (RTU)

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure g 0,02 (= 0,2 g/l)

(da g 0,040 di estratto naturale di piretro al 50%)

Abamectina pura g 0,0015 (= 0,015 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411).

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH 401). Contiene 1-2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica (EUH 208).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Leggere l'etichetta prima dell'uso (P103). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della regolamentazione nazionale vigente (P501). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). Non disperdere nell'ambiente (P273).

Titolare dell'autorizzazione: COMPO ITALIA Srl Via Marconato, 8 I-20811 - Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362512.1

Officine di produzione: Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen (DE)

Bib Production & Packaging b.v. – Randweg 7, 6045 JK Roermond – The Netherlands

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione Ministero della Salute n. 13215/PPO del 29/12/2011

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Contenuto Netto:

Partita n.

a) Trigger: 100 - 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000 ml

*b) Twin-chamber spray system: 100 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 1000 ml

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Piretrine 0,02%; Abamectina 0,0015%. Le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi :

Piretrine : bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso ventricolare periferico.

Abamectina - Trattamento in caso di: Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca. Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali. Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina: I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'adeguata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti l'attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina. In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveneni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina. Terapia: Sintomatica

Prescrizioni supplementari: Conservare la confezione ben chiusa; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE

COMPO FAZILO PRONTO USO è un insetticida-acaricida pronto all'uso ad ampio spettro d'azione, costituito da principi attivi di origine naturale. Risulta efficace nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa, balcone e giardino. COMPO FAZILO PRONTO USO risulta particolarmente indicato nella lotta contro *Cacysus marshalli* (farfallina del geranio), afidi, acari, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie in genere.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

COMPO FAZILO PRONTO USO va impiegato tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, avendo cura di bagnare bene tutte le superfici della pianta, inclusa la pagina inferiore delle foglie. Per il raggiungimento dei migliori risultati, specie nei confronti di insetti quali acari, tripidi, e aleurodidi si raccomandano 1-3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto presenta elevata selettività sulle diverse piante ornamentali. A titolo precauzionale, in giornate particolarmente calde eseguire i trattamenti nelle ore serali. Inoltre si sconsiglia l'uso su fiori d'orchidee, viole, impatiens, primule e begonie.

COMPATIBILITÀ: il prodotto s'impiega da solo

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione;

Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione;

Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione;

Non trattare su foglie bagnate;

Non trattare durante le ore più calde della giornata;

* Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

“Etichetta autorizzata con D.D. del 01-12-2013 , modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 e ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 12/10/2019”

ORTIVA HOBBY PFnPE

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, le colture orticole

Sospensione concentrata (SC)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Azoxystrobin puro g 23,2 (=250 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (EUH401). Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica (EUH208).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente (P501). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280).

COMPO ITALIA Srl Via Marconato 8 -I-20811 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362 512.1

Stabilimenti di produzione

AFP Plant, Syngenta Agribusiness – Grangemouth, Scotland (UK)

IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

Stabilimenti di confezionamento:

ENOFYTA Repacking & Warehouse site, Agiou Thoma Enofyta-Viotias (Grecia)

Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. 12315 Ministero della Salute del 20.04.2005

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Contenuto Netto: ml 10, 16, 20, 25, 40, 50, 100, 200

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

"Etichetta autorizzata con D.D. del 13-06-2011, modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 e ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 12/10/2019"

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

ORTIVA HOBBY è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translinare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo e di varie colture orticole. Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) ORTIVA HOBBY determina una maggior produzione con elevata qualità.

ORTIVA HOBBY è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*), e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmitosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Note:

Applicare ORTIVA HOBBY a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.

Su orzo di frumento ed orzo impiegare ORTIVA HOBBY in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.

Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).

Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Culture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchini, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/ha per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/ha	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/ha	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/ha per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora	80-100 ml/ha	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Alternariosi			
Oidio	80 ml/ha	0,7 l/ha	

Note:

Applicare ORTIVA HOBBY a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.

Su solanacee in pieno campo non utilizzare ORTIVA HOBBY per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo culturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo culturale alternando ogni applicazione di ORTIVA HOBBY con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.

Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette). Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianzo.

Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.

In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.

Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro. Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivaia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

Riemplire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluzione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.

FITOTOSSICITA'

ORTIVA HOBBY può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canada, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivate, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin). Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con ORTIVA HOBBY per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate. Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo ORTIVA HOBBY è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb. Per le colture orticole in pieno campo ORTIVA HOBBY è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefatate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme pre-

cauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.