

ARMICARB SPRAY PFNPE

Fungicida pronto all'uso per piante destinate al consumo alimentare e per piante ornamentali
LIQUIDO SENZA DILUIZIONE (AL)

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

ARMICARB SPRAY PFNPE Registrazione Ministero della salute n° 17217 del 11/11/2019

COMPOSIZIONE

Idrogenocarbonato di potassio (Bicarbonato di Potassio) 0,425 %p/p = (4,25 g/l)

Informazioni supplementari sui pericoli

(EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P103) Leggere l'etichetta prima dell'uso. (P262) Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. (P264) Lavare accuratamente dopo l'uso. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione: DE SANGOSSE SAS “Bonnell” CS10005 – 47480 Pont-du-Casse – Francia

Tel. +33 (0)5 53 69 36 30

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione (mese/anno) indicata sulla confezione unitamente al n lotto.

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.

In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.

Consultare un Centro Antiveneni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso a chiave in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.

Durante l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando **pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe**. Si consiglia l'uso di **guanti impermeabili**.

Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.

Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore (Sp1)

Terminato il trattamento sciacquare il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario e l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione. Eseguire il lavaggio restando nell'area trattata, non in prossimità di corsi di acqua, e distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura trattata. NON gettare l'acqua di lavaggio nelle fognature, attraverso gli scarichi domestici o i sistemi di scolo della strada.

Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti. Non riutilizzare il contenitore vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

ARMICARB SPRAY PFNPE è un fungicida di contatto pronto per l'uso. Agisce in maniera preventiva sulle ticchiate. È efficace contro l'oidio su alberi e arbusti, vite, coltivazioni orticole, piccoli frutti, piante ornamentali, piante aromatiche. Il meccanismo di azione del bicarbonato di potassio è legato all'alterazione del pH, della pressione osmotica e dell'equilibrio ione bicarbonato/ione carbonato dei funghi sensibili. Agisce per contatto e inibisce lo sviluppo delle ife apicali e delle spore (azione preventiva e curativa). La sua modalità di azione multi-sito rende i rischi di comparsa di una resistenza poco probabili. Un'umidità elevata durante o dopo l'applicazione favorisce l'efficacia. È questa la ragione per cui consigliamo di applicare **ARMICARB SPRAY PFNPE** di sera.

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO

Per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente l'estensione dell'area/il numero delle piante da trattare, prelevare il prodotto secondo le dosi indicate.

Non utilizzare in presenza di vento.

Non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e **attendere almeno 24 ore dal trattamento** prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata.

Non consentire l'accesso nell'area per almeno 24 ore dal trattamento, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

Metodo e attrezzature per l'applicazione Il prodotto **ARMICARB SPRAY PFNPE** è un prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'applicazione.

ARMICARB SPRAY PFNPE non è resistente al dilavamento. Se la piovosità è superiore ai 20 mm, bisognerà effettuare nuovamente l'applicazione. Secondo le condizioni climatiche e le infezioni, ripetere le applicazioni ogni 8-12 giorni. Non trattare se la temperatura giornaliera supera i 25°C. Non applicare **ARMICARB SPRAY PFNPE** con le alte temperature su coltivazioni orticole, coltivazioni di erbe aromatiche e bacche e nelle serre. Si raccomanda di applicare **ARMICARB SPRAY PFNPE** o di mattina o di sera quando l'umidità ambientale è elevata. Intervallo di rientro: Attendere l'asciugatura completa della porzione trattata.

INTERVALLO DI SICUREZZA (intervallo minimo tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto vegetale destinato al consumo alimentare): 3 giorni per tutte le colture. Per **fragole, frutti di piante arbustive, bacche e ortaggi a maturazione e raccolta scalare**, applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti/ortaggi che hanno già raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione e attendere in ogni caso che siano trascorsi **3 giorni prima del raccolto successivo**.

“Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30.12.2022”

Culture	Malattie	Dose autorizzata	Numero massimo di applicazioni (per anno)	Condizioni d'uso e periodo di applicazione
Mirtillo, lampone, ribes	Oidio	100 mL/m ²	5	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Pomodoro, melanzana, peperone, zuccina, cetriolo, cetriolino, peperoncino, peperoncino piccante, pepino, alkekengi e bacca di Goji.	Oidio	60 mL/m ²	6	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Fragola	Oidio	60 mL/m ²	6	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 8 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Piante aromatiche	Malattie fungine	60 mL/m ²	6	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Vite da vino	Oidio	100 mL/m ²	5	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
	Muffa grigia	100 mL/m ²	5	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 8 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Alberi e arbusti ornamentali in giardino familiare	Oidio	100 mL/m ²	5	Applicazione soltanto su foglie giovani. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Roseto in giardino familiare	Oidio	100 mL/m ²	5	Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Culture floreali in giardino familiare	Oidio	60 mL/m ²	6	Applicazione su fiori, foglie giovani e maturi. Rispettare un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.

Melo, pero, cotogno, nespola, pero giapponese, azzurlo	Ticchiolature	100 mL/m ²	5	Rispettare un intervallo minimo di 8 giorni tra un'applicazione e l'altra. Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia
Pesco, albicocco, nettarino	Moniliosi	100 mL/m ²	3	Rispettare un intervallo minimo di 3 giorni tra un'applicazione e l'altra. Stadio di applicazione: Alla comparsa dei sintomi della malattia

MISURE IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE: Evitare ulteriori colature o perdite di prodotto. Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua.

Officine di produzione:

Eurocup SAS Route de Grammont, 87200 Saint-Junien, Francia

Exwold Technology Ltd., PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BW, Regno Unito

Officine di confezionamento:

IRIS SA, 1126 Avenue du Moulinas, Salindres, Francia

BB - Bib Production & Packaging b.v., Randweg 7, 6045 JK Roermond, The Netherlands

W. Neudorff GmbH KG, Langes Feld 20, 31860 Emmerthal, Germany

KOLLANT SRL, Via C. Colombo 7-7A, 30030 Vigonovo (Ve), Italia

INDUPHARMA SRL, Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), Italia

Distribuito da:

SBM Life Science S.r.l., Via Montefeltro, 6, 20156 Milano, Italia

COMPO Italia S.r.l., Via Marconato, 8 I-20811 Cesano Maderno (MB), Italia

COPYR S.p.A. – Compagnia del Piretto, Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano (MI) - Italia

ORVITAL S.p.A. - Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI) – Italia

ITAL AGRO S.r.l. – Via Durini, 15, 20122 Milano (MI), Italia

Taglie autorizzate: ml 500-750 e 1 litro

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al n° tel./sito web: si prega di fare riferimento alle singole aziende distributrici