

**NEWPHARM Home&Garden s.r.l.**

Sede legale ed uffici: 35010 S. GIUSTINA IN COLLE (PD)  
Via Dell'Artigianato, 22  
Telefono: 049.9303165  
Fax: 049.9270501  
Sito: [www.newpharmgarden.it](http://www.newpharmgarden.it)  
E-mail : [info@newpharmgarden.it](mailto:info@newpharmgarden.it)  
Pec [newpharmgarden@pec.newpharmgarden.it](mailto:newpharmgarden@pec.newpharmgarden.it)  
Cod.Fisc. e Part. IVA: 01935990380  
Numero REA: PD - 428332

Santa Giustina in Colle, 07 febbraio 2020

**OGGETTO: NUOVA ETICHETTA PFnPE "TEFLUSTAR" (Reg. n. 12068 del 27/10/2006)**

Gentile Cliente,

con la presente inviamo la nuova etichetta del prodotto fitosanitario in oggetto valida dal 15 gennaio 2020.

Le principali variazioni rispetto alla precedente sono le seguenti:


- eliminazione dell'uso su ornamentali
- conversione del dosaggio da kg/ha a kg/100mq
- inserimento del consiglio di prudenza P280

Tale etichetta, qui in allegato, annulla e sostituisce quella precedentemente inviata.

Il nuovo stampato dovrà essere consegnato all'acquirente NON PROFESSIONALE unitamente alla confezione di vendita.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Newpharm Home&Garden S.r.l.  
Regulatory Affairs Manager  
Dr.ssa Erika Saccoccia



# TEFLUSTAR PFnPE

Insetticida granulare in barattolo spargitore  
per la protezione di numerose colture

Registrazione Ministero della Salute n° 12068 del 27/10/2006

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con  
validità fino al 02/05/2020

Composizione	
100 g di prodotto contengono:	
- Teflutrin puro	g 0,2
- Coformulanti q.b. a	g 100



ATTENZIONE

## INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 - Molto tossico per gli organismi  
acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA:

GENERALE: P102 -Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 - Evitare di respirare la polvere.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 – Indossare guanti.

REAZIONE: P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 - Conservare lontano da alimenti o  
mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in accordo  
alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: **Diachem S.p.A.**

Via Tonale, 15 Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611

Stabilimento di produzione:

**Diachem S.p.A.** - U.P. SIFA Caravaggio (BG)

DISTRIBUITO da:

**COMPO ITALIA S.r.l.** - Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno  
(MB) - Tel. 0362 512.1

**COPYR S.p.A.** - via Stephenson 29 - 20157 Milano (MI) - Tel. 02  
390368.1

**ICL ITALIA TREVISO S.r.l.** - Via D. Monterumici 8 - 31100 Treviso -  
Tel. 0422 436331

**SBM Life Science S.r.l.** - Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano Tel. 02  
83968856

**Newpharm Home&Garden S.r.l.** - Via dell'Artigianato, 22 - 35010  
Santa Giustina in Colle (PD) - Tel. +39 049 9303165

Quantità netta del preparato:

Kg 0,3-0,35-0,5

Partita n.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con  
il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale

## ETICHETTA USO NON PROFESSIONALE

d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare  
la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque  
dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli  
organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata  
non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 metri in caso di  
applicazioni su ortaggi a foglia, a radice ed a stelo e di 5 metri  
in caso di applicazioni su ortaggi a frutto. Utilizzare i guanti  
durante l'applicazione.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando  
pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.  
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed  
asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia;  
irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e  
dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi,  
ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare  
periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveneni.

## CARATTERISTICHE

TEFLUSTAR è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei  
confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che  
trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il prodotto  
agisce per contatto e, nella fase di vapore, possiede una forte  
attività repellente che aumenta l'efficacia protettiva.

TEFLUSTAR è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo  
d'azione, diverso rispetto ai prodotti organo-fosforici e  
carbammati, può anche risultare idoneo per le raccomandazioni  
tecniche che prevedono la rotazione nell'impiego dei  
geodisinfestanti.

Grazie alla particolare formulazione, il prodotto esplica una azione  
stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello  
stress da trapianto.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

TEFLUSTAR va applicato lungo la fila al momento della semina o  
del trapianto richiudendo subito il solco in modo tale che il  
prodotto sia ricoperto dal terreno.

## CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Le dosi qui riportate si riferiscono a trattamenti lungo la fila della  
coltura. Impiegare le dosi maggiori nelle aree ove sulle precedenti  
coltivazioni si sono già verificate significative infestazioni.

## Divieto di impiego in serra.

Come di norma prima delle usuali pratiche di manutenzione pulire  
l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

COLTURA	PARASSITI	DOSE kg/100 m <sup>2</sup>
Pomodoro, melanzana, peperone, cavolo cappuccio, cavolfiore, rapa, carota, melone, cetriolo, cocomero, finocchio, sedano, Lattughe e altre insalate, fagiolo, fagiolino, pisello, rutabaga, asparago	<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp., <i>Ceutorhynchus</i> <i>pleurostigma</i> , <i>Blaniulus</i> <i>guttulatus</i> , <i>Centipeda</i> spec., <i>Chaetocnema</i> <i>tibialis</i> , <i>Chamaepsila</i> <i>rosae</i> , <i>Hylemya</i> sp., <i>Melolontha melolontha</i> , <i>Tipula</i> sp.	0,4-0,5 (esclusivamente in campo)
Patata	<i>Agriotes</i> spp., <i>Agrotis</i> spp., <i>Diabrotica</i> spp.	0,3-,04 (esclusivamente in campo)

## COMPATIBILITÀ

Non è previsto l'impiego in miscela con altri antiparassitari.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE:

I coformulanti utilizzati nella formulazione del prodotto contengono azoto e  
fosforo (10:44), Manganese (3%) e Zinco (2%), il cui quantitativo va tenuto  
in considerazione nella preparazione del piano di concimazione della  
coltura, al fine di evitare sovradosaggi di fertilizzanti.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni  
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni  
contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare  
l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli  
animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER  
L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE  
COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. OPERARE IN ASSENZA  
DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE  
COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**